

防除情報

長崎県病害虫防除所長

令和6年度病害虫発生予察防除情報第16号

かんきつ ミカンハダニの防除対策について

現在、かんきつにおけるミカンハダニの発生が多い状況です。果実への加害が懸念されるので、ハダニ類の密度を下げるため、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) 10月前期の巡回調査（36筆）の結果、寄生葉率は18.6%（平年 1.7%）、発生圃場率は50.0%（同 13.2%）と平年より高い（図1、2）。ただし、発生の圃場間差はかなり大きい。
- (2) 気象予報（福岡管区气象台、令和6年10月10日発表）によると、向こう1か月の気温はかなり高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 ミカンハダニ 寄生葉率の推移




図2 ミカンハダニ 発生圃場率の推移

2. 防除対策

- (1) これから着色が進む品種については、加害により着色不良を起こすおそれがあるので、発生が確認される場合は防除を検討する。
- (2) 薬剤散布の際は、薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。
- (3) 薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統（令和6年長崎県病害虫防除基準P390～393 およびP398～401の「作用機構による分類（IRAC）」参照）の薬剤は連用しない。
- (4) 収穫期に近い園では、薬剤の選択にあたっては、収穫前日数に注意する。
- (5) 周囲に収穫期に入っている園がある場合は、薬剤の飛散に十分注意する。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室
（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス

：<https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/JPP/index.html>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室
（長崎県病害虫防除所） TEL：0957-26-0027

